

Résultats pour le stage de médecine interne

TABLEAU 1 .

Pourcentage des répondants qui ont perçu chez la plupart de leurs superviseurs de stage en médecine interne qu'il était important d'effectuer les interventions de prévention suivantes :

Vérifier les facteurs pouvant affecter la santé du patient

Statut tabagique	94,7
Consommation d'alcool	90,9
Niveau d'activité physique	33,8
Travail du patient	57,3
Situation familiale et sociale	22
Indice de masse corporelle	42,2
Tour de taille	18,7

Dépister certaines conditions ou maladies

S'assurer que les femmes âgées de 50 à 69 ans aient eu leur mammographie de dépistage du cancer du sein au cours des 2 dernières années	11,6
S'assurer que le test de Pap ait été fait lorsqu'il était indiqué	2,1
Discuter avec les patients de 50 ans ou plus du dépistage du cancer colorectal	23,4
Évaluer le risque de chute chez les patients âgés	31,9
Dépister les patients de tout âge pouvant être victimes de négligence, de violence ou d'abus sexuels	4,4
Identifier les patients souffrant de dépression.	13,2

Contribuer à protéger la santé de la population

Se laver les mains entre chaque patient	79
S'assurer que les personnes visées par le programme de vaccination contre l'influenza soient vaccinées annuellement	32,2
Déclarer à la santé publique les maladies pouvant représenter une menace pour la santé de la population (MADO)	32,3

MÉDECINE INTERNE

TABLEAU 2 .

Pourcentage des répondants qui ont perçu chez la plupart de leurs superviseurs de stage de **médecine interne** qu'il était important d'adopter les conduites suivantes :

Lorsque vous identifiez des habitudes de vie nuisibles à la santé, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs l'importance d'offrir du counselling aux ...

Patients fumeurs	44
Patients sédentaires	26,3
Patients ayant une consommation abusive d'alcool	42,9
Patients ayant de mauvaises habitudes alimentaires	22,5

Lorsqu'une habitude de vie affectait la santé d'un patient, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs l'importance de ...

Connaître le point de vue du patient sur son habitude de vie	17,5
Évaluer la motivation du patient à modifier son habitude	21,8
Ajuster le counselling au stade de changement du patient	13,2
Orienter au besoin le patient vers des ressources professionnelles ou communautaires, autres que des médecins	23,5

Lorsque vous aviez à faire l'évaluation d'un patient, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs qu'ils s'attendaient à ce que vous vérifiez :

Ce que le patient pense avoir comme problème	30,8
Les attentes du patient	32,3
Si le patient comprend le plan de traitement proposé	61,1
Si le patient est d'accord avec la conduite proposée	56,3