

Résultats "aucun des 7 stages cliniques obligatoires"

TABLEAU 1 .

Pourcentage des répondants qui n'ont perçu dans aucun des 7 stages obligatoires que chez la plupart de leurs superviseurs de stage il était important d'effectuer les interventions de prévention suivantes :

Vérifier les facteurs pouvant affecter la santé du patient

Statut tabagique	0
Consommation d'alcool	,4
Niveau d'activité physique	12,4
Travail du patient	3,3
Situation familiale et sociale	2,5
Indice de masse corporelle	19,4
Tour de taille	44,9

Dépister certaines conditions ou maladies

S'assurer que les femmes âgées de 50 à 69 ans aient eu leur mammographie de dépistage du cancer du sein au cours des 2 dernières années	9,9
S'assurer que le test de Pap ait été fait lorsqu'il était indiqué	2,1
Discuter avec les patients de 50 ans ou plus du dépistage du cancer colorectal	25,5
Évaluer le risque de chute chez les patients âgés	0
Dépister les patients de tout âge pouvant être victimes de négligence, de violence ou d'abus sexuels	20,6
Identifier les patients souffrant de dépression.	2,6

Contribuer à protéger la santé de la population

Se laver les mains entre chaque patient	6
S'assurer que les personnes visées par le programme de vaccination contre l'influenza soient vaccinées annuellement	16,5
Questionner les patients sur leurs pratiques sexuelles afin d'identifier les personnes à risque (de ou ayant pu) contracter une ITS	7,3
Identifier les partenaires sexuels des personnes ayant une ITS afin qu'ils soient traités	24,7
Déclarer à la santé publique les maladies pouvant représenter une menace pour la santé de la population (MADO)	35,4

AUCUN DES STAGES

TABLEAU 2 .

Pourcentage des répondants qui n'ont perçu dans **aucun des 7 stages obligatoires** que chez la plupart de leurs superviseurs de stage il était important d'adopter les conduites suivantes :

Lorsque vous identifiez des habitudes de vie nuisibles à la santé, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs l'importance d'offrir du counselling aux ...

Patients fumeurs	7,3
Patients sédentaires	19,7
Patients ayant une consommation abusive d'alcool	9,1
Patients ayant de mauvaises habitudes alimentaires	23,8
Patients ayant des pratiques sexuelles à risque pour les ITS	9,9

Lorsqu'une habitude de vie affectait la santé d'un patient, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs l'importance de ...

Connaître le point de vue du patient sur son habitude de vie	28,1
Évaluer la motivation du patient à modifier son habitude	22,3
Ajuster le counselling au stade de changement du patient	36,4
Orienter au besoin le patient vers des ressources professionnelles ou communautaires, autres que des médecins	14,8

Lorsque vous aviez à faire l'évaluation d'un patient, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs qu'ils s'attendaient à ce que vous vérifiez :

Ce que le patient pense avoir comme problème	27,7
Les attentes du patient	18,4
Si le patient comprend le plan de traitement proposé	10
Si le patient est d'accord avec la conduite proposée	13,1