

Résultats pour le stage de médecine familiale

TABLEAU 1 .

Pourcentage des répondants qui ont perçu chez la plupart de leurs superviseurs de stage en **médecine familiale** qu'il était important d'effectuer les interventions de prévention suivantes :

Vérifier les facteurs pouvant affecter la santé du patient

Statut tabagique	97,5
Consommation d'alcool	95,9
Niveau d'activité physique	74,4
Travail du patient	82,2
Situation familiale et sociale	61
Indice de masse corporelle	67,1
Tour de taille	46,7

Dépister certaines conditions ou maladies

S'assurer que les femmes âgées de 50 à 69 ans aient eu leur mammographie de dépistage du cancer du sein au cours des 2 dernières années	80,7
S'assurer que le test de Pap ait été fait lorsqu'il était indiqué	79,9
Discuter avec les patients de 50 ans ou plus du dépistage du cancer colorectal	61,5
Évaluer le risque de chute chez les patients âgés	40,4
Dépister les patients de tout âge pouvant être victimes de négligence, de violence ou d'abus sexuels	32
Identifier les patients souffrant de dépression.	75,3

Contribuer à protéger la santé de la population

Se laver les mains entre chaque patient	63,1
S'assurer que les personnes visées par le programme de vaccination contre l'influenza soient vaccinées annuellement	62,6
Questionner les patients sur leurs pratiques sexuelles afin d'identifier les personnes à risque (de ou ayant pu) contracter une ITS	79,5
Identifier les partenaires sexuels des personnes ayant une ITS afin qu'ils soient traités	67,4
Déclarer à la santé publique les maladies pouvant représenter une menace pour la santé de la population (MADO)	54,4

MÉDECINE FAMILIALE

TABLEAU 2 .

Pourcentage des répondants qui ont perçu chez la plupart de leurs superviseurs de stage de médecine familiale qu'il était important d'adopter les conduites suivantes :

Lorsque vous identifiez des habitudes de vie nuisibles à la santé, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs l'importance d'offrir du counselling aux ...

Patients fumeurs	88,8
Patients sédentaires	72,4
Patients ayant une consommation abusive d'alcool	77,9
Patients ayant de mauvaises habitudes alimentaires	65,6
Patients ayant des pratiques sexuelles à risque pour les ITS	73,3

Lorsqu'une habitude de vie affectait la santé d'un patient, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs l'importance de ...

Connaître le point de vue du patient sur son habitude de vie	64,9
Évaluer la motivation du patient à modifier son habitude	69,9
Ajuster le counselling au stade de changement du patient	55,7
Orienter au besoin le patient vers des ressources professionnelles ou communautaires, autres que des médecins	72,2

Lorsque vous aviez à faire l'évaluation d'un patient, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs qu'ils s'attendaient à ce que vous vérifiez :

Ce que le patient pense avoir comme problème	65,2
Les attentes du patient	73,1
Si le patient comprend le plan de traitement proposé	78,3
Si le patient est d'accord avec la conduite proposée	77