

Résultats pour le stage de psychiatrie

TABLEAU 1 .

Pourcentage des répondants qui ont perçu chez la plupart de leurs superviseurs de stage en psychiatrie qu'il était important d'effectuer les interventions de prévention suivantes :

Vérifier les facteurs pouvant affecter la santé du patient

Statut tabagique	59,6
Consommation d'alcool	87,9
Niveau d'activité physique	12,8
Travail du patient	72,7
Situation familiale et sociale	77,6

Dépister certaines conditions ou maladies

Évaluer le risque de chute chez les patients âgés	0
Dépister les patients de tout âge pouvant être victimes de négligence, de violence ou d'abus sexuels	26,4
Identifier les patients souffrant de dépression.	88,4

PSYCHIATRIE

TABLEAU 2 .

Pourcentage des répondants qui ont perçu chez la plupart de leurs superviseurs de stage de psychiatrie qu'il était important d'adopter les conduites suivantes :

Lorsque vous identifiez des habitudes de vie nuisibles à la santé, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs l'importance d'offrir du counselling aux ...

Patients fumeurs	11,7
Patients sédentaires	4,4
Patients ayant une consommation abusive d'alcool	57

Lorsqu'une habitude de vie affectait la santé d'un patient, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs l'importance de ...

Connaître le point de vue du patient sur son habitude de vie	22,6
Évaluer la motivation du patient à modifier son habitude	21,5
Ajuster le counselling au stade de changement du patient	20,7
Orienter au besoin le patient vers des ressources professionnelles ou communautaires, autres que des médecins	34,4

Lorsque vous aviez à faire l'évaluation d'un patient, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs qu'ils s'attendaient à ce que vous vérifiez :

Ce que le patient pense avoir comme problème	39,1
Les attentes du patient	39,6
Si le patient comprend le plan de traitement proposé	44,6
Si le patient est d'accord avec la conduite proposée	43,5