

Résultats pour le stage d'obstétrique-gynécologie

TABLEAU 1 .

Pourcentage des répondants qui ont perçu chez la plupart de leurs superviseurs de stage en **obstétrique-gynécologie** qu'il était important d'effectuer les interventions de prévention suivantes :

Vérifier les facteurs pouvant affecter la santé du patient

Statut tabagique	70,8
Consommation d'alcool	67,1
Niveau d'activité physique	11,5
Travail du patient	41,5
Situation familiale et sociale	36,9

Dépister certaines conditions ou maladies

S'assurer que les femmes âgées de 50 à 69 ans aient eu leur mammographie de dépistage du cancer du sein au cours des 2 dernières années	48,9
S'assurer que le test de Pap ait été fait lorsqu'il était indiqué	86,8
Dépister les patients de tout âge pouvant être victimes de négligence, de violence ou d'abus sexuels	26,3
Identifier les patients souffrant de dépression.	13,6

Contribuer à protéger la santé de la population

Se laver les mains entre chaque patient	59,2
Questionner les patients sur leurs pratiques sexuelles afin d'identifier les personnes à risque (de ou ayant pu) contracter une ITS	81,9
Identifier les partenaires sexuels des personnes ayant une ITS afin qu'ils soient traités	52,9
Déclarer à la santé publique les maladies pouvant représenter une menace pour la santé de la population (MADO)	25,2

OBSTÉTRIQUE- GYNÉCOLOGIE

TABLEAU 2 .

Pourcentage des répondants qui ont perçu chez la plupart de leurs superviseurs de stage de **obstétrique-gynécologie** qu'il était important d'adopter les conduites suivantes :

Lorsque vous identifiez des habitudes de vie nuisibles à la santé, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs l'importance d'offrir du counselling aux ...

Patients fumeurs	29,3
Patients sédentaires	4,4
Patients ayant une consommation abusive d'alcool	20,3
Patients ayant de mauvaises habitudes alimentaires	15,4
Patients ayant des pratiques sexuelles à risque pour les ITS	70,7

Lorsqu'une habitude de vie affectait la santé d'un patient, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs l'importance de ...

Connaître le point de vue du patient sur son habitude de vie	7,9
Évaluer la motivation du patient à modifier son habitude	8,3
Ajuster le counselling au stade de changement du patient	6,6
Orienter au besoin le patient vers des ressources professionnelles ou communautaires, autres que des médecins	12,2

Lorsque vous aviez à faire l'évaluation d'un patient, avez-vous perçu chez la plupart de vos superviseurs qu'ils s'attendaient à ce que vous vérifiez :

Ce que le patient pense avoir comme problème	15,6
Les attentes du patient	24,2
Si le patient comprend le plan de traitement proposé	51,1
Si le patient est d'accord avec la conduite proposée	54,5